

SpecLinx-50[®]

(lincomycin-spectinomycin soluble powder)

FOR USE IN CHICKENS ONLY

WATER SOLUBLE POWDER

ANTIBACTERIAL AND
ANTIMYCOPLASMAL

ANADA 200-380, Approved by FDA

English Version



MADE IN USA

INDICATIONS

For use in chickens up to 7 days of age as an aid in the control of: Airsacculitis caused by either *Mycoplasma synoviae* or *Mycoplasma gallisepticum* susceptible to lincomycin-spectinomycin. Complicated Chronic Respiratory Disease (Air Sac Infection) caused by *Escherichia coli* and *M. gallisepticum* susceptible to lincomycin-spectinomycin.

BENEFITS

- **Highly soluble:** Mixes easily and completely in water
- **Convenient:** Pre-measured packaging provides for handy on-site mixing
- **Stable:** Stores well at room temperature
- **FDA approved**



PACKAGING

LIST NO.	UNIT PACKAGE	CASE SIZE
1LIN009	2.65 oz (75 g) packet	12

CAUTION

Federal (USA) law restricts this drug to use by or on the order of a licensed veterinarian.

Bimeda, Inc.

One Tower Lane, Suite 2250

Oakbrook Terrace, IL 60181 USA

Toll Free Tel. 888-524-6332 • Toll Free Fax. 877-888-7035

Email: Sales@BimedaUS.com

See reverse side for additional information



BimedaUS.com

SpecLinx-50[®]

(lincomycin-spectinomycin soluble powder)

FOR USE IN CHICKENS ONLY

WATER SOLUBLE POWDER

ANTIBACTERIAL AND ANTIMYCOPLASMAL

ANADA 200-380, Approved by FDA

Restricted Drug (California) - Use Only as Directed

CAUTION: Federal (USA) law restricts this drug to use by or on the order of a licensed veterinarian.

2.65 oz (75 g) packet contains:

Lincomycin hydrochloride
 Equivalent to lincomycin 16.7 grams
 Spectinomycin dihydrochloride pentahydrate
 Equivalent to spectinomycin 33.3 grams
 Total Antibiotic Activity..... 50.0 grams

INDICATIONS AND USAGE:

For use in chickens up to 7 days of age as an aid in the control of: Airsacculitis caused by either *Mycoplasma synoviae* or *Mycoplasma gallisepticum* susceptible to lincomycin-spectinomycin. Complicated Chronic Respiratory Disease (Air Sac Infection) caused by *Escherichia coli* and *M. gallisepticum* susceptible to lincomycin-spectinomycin.

DOSAGE:

Provide 2 grams (g) antibiotic activity per gallon of drinking water. Administer as the sole source of water for the first 5 to 7 days of life.

ADMINISTRATION:

Amount of SpecLinx-50 [®]	Amount of Drinking Water
1 packet	25 gallons

For proportioners delivering 1 ounce of solution per gallon of drinking water, dissolve contents of 5 packets in each gallon of proportioner solution.

IMPORTANT:

Chickens should consume water at the following approximate rate to insure intake of the required dose of lincomycin-spectinomycin indicated:

BROILERS AND LAYER REPLACEMENTS (LIGHT AND HEAVY)		
Age (Weeks)	Daily Water intake Gallons/1000	Dosage mg Antibiotic/Lb
1	5	50-65

PRECAUTION:

Discard medicated drinking water daily and replace with fresh medicated drinking water.

STORAGE:

Store at controlled room temperature 20°C -25°C (68°F-77°F), with excursions permitted to 15°C-30°C (59°F-86°F).

WARNING:

FOR ANIMAL USE ONLY
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

HOW SUPPLIED:

SpecLinx-50[®] is supplied in 2.65 oz (75 g) foil packets.

To obtain an SDS or for assistance contact BImeda, Inc. at 1-888-524-6332.



SpecLinx-50[®]

(lincomicina-espectinomina en polvo soluble)

PARA USO EN POLLOS ÚNICAMENTE

POLVO HIDROSOLUBLE

ANTIBACTERIAL AND
ANTIMYCOPLASMAL

ANADA 200-380, Aprobado por la FDA

Versión en español



MADE IN USA

INDICACIONES

Para uso en pollos de hasta 7 días como ayuda para el control de: Aerosaculitis causada por *Mycoplasma synoviae* o *Mycoplasma gallisepticum* y sensible a la combinación de lincomicina y espectinomina. Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada (infección del alvéolo pulmonar) causada por *Escherichia coli* y *M. gallisepticum* y sensible a la combinación de lincomicina y espectinomina.

BENEFICIOS

- **Altamente Soluble:** Mezclado fácil y completo en agua de bebida
- **Práctico:** Presentaciones pre medidas que proveen una práctica mezcla
- **Estable:** Se almacena a temperatura ambiente
- **Aprobado por la FDA**



PRESENTACIONES

LIST NO.	UNIT PACKAGE	CASE SIZE
1LIN009	2.65 oz (75 g) paquete	12

PRECAUCIÓN

Las leyes federales (UU. SS.) restringen este fármaco al uso por o bajo la orden de un veterinario con licencia.

Bimeda, Inc.

One Tower Lane, Suite 2250
Oakbrook Terrace, IL 60181 USA

Toll Free Tel. 888-524-6332 • Toll Free Fax. 877-888-7035

Email: Sales@BimedaUS.com

Vea al reverso las indicaciones



BimedaUS.com

SpecLinx-50[®]

(lincomicina-espectinomina en polvo soluble)

PARA USO EN POLLOS ÚNICAMENTE

POLVO HIDROSOLUBLE

ANTIBACTERIAL AND ANTIMYCOPLASMAL

ANADA 200-380, Aprobado por la FDA

Fármaco restringido (California) – Úselo únicamente según las indicaciones

Las leyes federales (UU. SS.) restringen este fármaco al uso por o bajo la orden de un veterinario con licencia.

Cada 75 g de SpecLinx-50[®] contiene:

Clorhidrato de lincomicina	
Equivalente a lincomicina.....	16.7 gramos
Diclorhidrato de espectinomina pentahidratado	
Equivalente a espectinomina	33.3 gramos
Actividad Antibiótica Total	50.0 gramos

INDICACIONES Y USO:

Para uso en pollos de hasta 7 días de como ayuda para el control de:

Aerosaculitis causada por *Mycoplasma synoviae* o *Mycoplasma gallisepticum* y sensible a la combinación de lincomicina-espectinomina.

Enfermedad Respiratoria Crónica Complicada (infección del alvéolo pulmonar) causada por *Escherichia coli* y *M. gallisepticum* y sensible a la combinación de lincomicina-espectinomina.

DOSIS:

Suministre 2 gramos (g) de antibiótico por galón de agua. Administre como única fuente de bebida durante los primeros 5 a 7 días de vida.

ADMINISTRACIÓN:

Canridad de SpecLinx-50 [®]	Cantidad de agua
1 paquete	25 galones

En los dosificadores que suministran 1 onza de solución por galón de agua, disuelva el contenido de 5 paquetes en cada galón de solución del dosificador.

IMPORTANTE:

Los pollos deben consumir aproximadamente la siguiente proporción de agua para asegurar la ingestión de la dosis necesaria de lincomicina-espectinomina indicada:

POLLOS DE ENGORDE Y DE REEMPLAZO DE PONEDORAS (LIVIANOS Y PESADOS)		
Edad (semanas)	Consumo diario de agua en galones/1000	Dosis en mg de antibiótico/lb
1	5	50-65

PRECAUCIÓN:

Deseche diariamente el agua tratada y reemplácela por agua tratada fresca.

STORAGE:

Guarde a temperatura ambiente controlada de 20°C a 25°C (68°F a 77°F), con desviaciones temporales de 15°C a 30°C (59°F a 86°F).

ADVERTENCIA:

**PARA USO EN ANIMALES ÚNICAMENTE
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRESENTACIÓN:

SpecLinx-50[®] se distribuye en paquete de aluminio de 2.65 oz (75 g).

Para obtener una Hoja de Seguridad (HDS) o asistencia, contacte a Bimeda, Inc. al teléfono 1-888-524-6332.