

Modelo de bula

## Mogiflox

**USO VETERINÁRIO**  
**(enrofloxacino a 10 %)**  
**SOLUÇÃO INJETÁVEL**

**FÓRMULA:** Cada 100 mL contém:

Enrofloxacino.....10,00 g  
Veículo q.s.p.....100,00 mL

### INDICAÇÕES:

#### Suínos:

O produto **Mogiflox** é indicado para o tratamento das infecções causada por **Salmonella choleraesius**

### POSOLOGIA E MODO DE USAR:

O **Mogiflox** está indicado para ser utilizado de acordo com a posologia abaixo, por via intramuscular.

Dosagem: 2,5 mg de enrofloxacino para cada kg de peso uma vez ao dia.

#### Suínos:

Aplicar 01 mL de **Mogiflox** para cada 40 kg de peso corporal, diariamente durante 03 a 05 dias.

Nas infecções severas, aplicar 1,0 mL do produto para cada 20 kg de peso corporal, diariamente, durante 05 dias (5 mg/kg).

Quando o volume a ser injetado for superior a 10 mL, aconselha-se a dividir este volume em dois ou mais ponto de aplicação.

### EFEITOS COLATERAIS:

O **Mogiflox** é de grande segurança. Possui uma boa tolerância, com ampla margem de segurança, mesmo com administração prolongada nas doses recomendadas.

Podem ocorrer *rush* cutâneos e ou pruridos em animais hipersensíveis ao enrofloxacino.

### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**SUÍNOS:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

**INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:**

Não administrar juntamente com nitrofurantoína, alcalinizantes da urina (bicarbonato de sódio, citratos ou inibidores da anidrase carbônica) e do probenecide, pois podem causar nefrotoxicidade, apesar de serem raras.

Não aplicar juntamente com medicamentos contendo magnésio, zinco, cálcio e ferro, pois eles reduzem a absorção das quinolonas.

Antagonismo com tetraciclinas e sulfas + trimetoprim.

A administração com anti-inflamatórios não esteroidais podem levar a excitação do Sistema Nervoso Central

**PRECAUÇÕES:**

Observar os cuidados normais de assepsia para injeção em animais.

**PRAZO DE VALIDADE:** 2 (dois) anos após a data de fabricação.

Após a abertura do frasco, utilizar o produto em até 60 dias.

**APRESENTAÇÃO:**

**Mogiflox** é apresentado em frasco de vidro âmbar de 20 mL e 50 mL e frasco plástico de 500 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº SP

000174-0.000005 em 19/10/20

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira – CRMV SP 9010 S

**PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, 421

Monte Mor / SP – CEP 13190-000

CNPJ: 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

[www.bimeda.com.br](http://www.bimeda.com.br)