

# Sincroben®

## USO VETERINÁRIO

### (benzoato de estradiol)

#### SINCRONIZADOR DE DESENVOLVIMENTO FOLICULAR E INDUTOR DE OVULAÇÃO EM BOVINOS

**FÓRMULA:** Cada 100 mL contém:

Benzoato de estradiol ..... 0,10 g  
Veículo ..... q.s.p. ..... 100,00 mL

#### INDICAÇÕES

Sincroben é uma solução indicada para bovinos:

- Na sincronização da onda de desenvolvimento folicular ou sincronização de cio com dispositivos e implantes de progestágenos ou progesterona;
- Na indução da ovulação;
- Em protocolos de inseminação artificial em tempo fixo (IATF).

#### MODO DE USAR E DOSAGEM

Sincroben é de uso parenteral, administrado exclusivamente por via intramuscular, nas doses de 2 a 3 mL, ou seja, 2 a 3 mg de benzoato de estradiol por animal.

A dose e o intervalo entre as doses dependem do programa de reprodução adotado pelo Médico Veterinário e a resposta do animal.

#### PRECAUÇÕES

- O produto não deve ser administrado em fêmeas prenhes;
- O estado nutricional e o manejo inadequado dos animais podem levar a resultados insatisfatórios quando da administração do produto;
- Mulheres grávidas e pessoas asmáticas não devem manusear este produto;
- Evitar contato direto com a pele e em caso de derramamento acidental, lavar o local com água corrente;
- Durante o tratamento com o produto, não utilizar outro quimioterápico simultaneamente;
- O tratamento quando realizado sob orientação do Médico Veterinário e na posologia recomendada, não deverá produzir reações adversas;
- Não utilizar as embalagens vazias para acondicionar produtos de uso humano;
- Utilizar seringas e agulhas estéreis para aplicar o produto.

#### PERÍODO DE CARÊNCIA:

**ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

**BOVINOS:**

**ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.**

**LEITE: CARÊNCIA ZERO.**

**A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.**

#### EFEITOS ADVERSOS

Não há relatos de contraindicações e limitações de uso para a espécie indicada, quando seguidas corretamente as recomendações e orientações de administração do produto.

O comportamento de cio pode ser observado após a aplicação. No caso de associação com progesterona isto é incomum, já no caso de aplicação após a retirada da progesterona isto é desejável.

Doses maiores e prolongadas em vacas podem induzir longos períodos de cio, irritação vaginal e tensão pós parto com prolapso vaginal. Em vacas gestantes pode produzir aborto.

#### PRAZO DE VALIDADE

02 (dois) anos após a data de fabricação. Após a primeira perfuração o produto pode ser utilizado por até 30 dias.

#### APRESENTAÇÃO

Cartuchos contendo 1 frasco-ampola de 10 mL ou de 50 mL.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

#### VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.603 em 27/05/2011.  
Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

#### PROPRIETÁRIO

Bimeda Brasil S.A.  
Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421  
Monte Mor/SP - CEP 13190-000  
CNPJ 00.328.741/0001-04  
SAC 0800 555408 - www.bimeda.com.br

#### FABRICANTE

Jofadel Indústria Farmacêutica S/A  
Av. Dr. José da Frota Vasconcelos, nº 100  
Varginha/MG - CEP 37062-500  
CNPJ 17.843.582/0001-70

INDÚSTRIA BRASILEIRA