

Texvet Max[®]

USO VETERINÁRIO

(cipermetrina, clorpirifós e butóxido de piperonila)

CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA E BERNICIDA

FÓRMULA: Cada 100 mL contém:

Cipermetrina	15,00 g
Clorpirifós	25,00 g
Butóxido de piperonila	1,00 mL
Veículo	q.s.p. 100,00 mL

INDICAÇÕES

Texvet Max é indicado para uso em pulverizações, no combate aos seguintes ectoparasitas que acometem os bovinos: Carrapatos do gênero **Boophilus microplus** (adultos e imaturos), Larvas de **Dermatobia hominis** e Moscas do gênero **Haematobia irritans** (adultos).

DOSAGEM

A dose recomendada de Texvet Max é de 1 mL para 1 L de água. A diluição recomendada é de 20 mL em 20 L de água (clorada ou não). Banhar os animais utilizando-se de 4 a 5 litros de calda por animal. Esta preparação deve ser feita em um recipiente adequado colocando-se a água e em seguida o produto e agitar até que se forme uma emulsão branca.

Para o processo de pulverização utilizar bomba com capacidade adequada e aspergir o produto sobre o animal, utilizando cerca de 4 a 5 litros de calda para cada animal adulto, no sentido contrário da pelagem, com especial atenção para a cabeça, orelhas, axilas, virilha, úbere e inserção da cauda.

Após diluição, utilizar o produto no máximo em 6 horas.

Quantidade de produto Texvet Max	Quantidade de água (clorada ou não)
1 litro	1.000 litros
500 mL	500 litros
250 mL	250 litros
100 mL	100 litros
20 mL	20 litros

CONTRAINDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO

Não administrar em fêmeas prenhes e animais com menos de 07 meses.

Não aplicar em animais debilitados, exaustos, estressados ou doentes.

Não administrar em animais com a pele lesionada.

Não administrar o produto em períodos de previsão de chuvas. A eficácia do produto após banho de chuva não foi demonstrada.

Não administrar em animais com hipersensibilidade conhecida aos princípios ativos do produto.

Não aplicar o produto nas horas de calor intenso.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos, deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações.

Produtos que ativam os receptores colinérgicos e relaxantes musculares periféricos devem ser evitados quando se fizer uso de organofosforados.

Os tranquilizantes fenotiazínicos aumentam a toxicidade dos organofosforados.

A succinilcolina e outros agentes bloqueadores neuromusculares podem potencializar os efeitos nicotínicos dos organofosforados.

PRECAUÇÕES

Antes de utilizar o produto, é indicada a realização de biocarrapaticidograma para avaliar a resistência de carrapatos aos princípios ativos. Consulte um Médico Veterinário.

Manter a embalagem fechada.

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto.

Utilizar pulverizadores (manuais ou motorizados), em bom estado de conservação, com boa pressão e previamente bem lavados, caso tenham sido previamente utilizados com outro tipo de produto.

Produto tóxico para peixes.

Evitar longo contato com a pele, mucosa e a inalação do produto.

Pulverizar vacas leiteiras somente depois da ordenha e lavar o úbere das vacas tratadas antes da ordenha.

Lavar as mãos após o manuseio do produto e não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

Utilizar equipamentos de proteção individual (luvas, macacão, óculos de proteção, gorro e máscara contra gases tóxicos) no momento da preparação e aplicação do produto.

Não reutilizar as embalagens vazias.

Pulverizar o produto a favor do vento.

REAÇÕES ADVERSAS

Na posologia indicada e sob orientação do Médico Veterinário não devem ocorrer intoxicações nas espécies para qual o produto é indicado.

Os piretróides possuem potente atividade inseticida com baixa toxicidade em mamíferos, geralmente são seguros, mas em caso de intoxicação acidental podem causar alergia, náusea, vômito e dor de cabeça.

Os organofosforados, em caso de intoxicação acidental, podem provocar, principalmente, os seguintes efeitos tóxicos: letargia, anorexia, diarreia, polaciúria, vômitos, salivação e tremores musculares.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

Evitar o contato do produto com a pele e mucosas do corpo humano. No caso de contatos acidentais, lavar as partes atingidas várias vezes com água e sabão.

Em casos de intoxicação humana, procurar um médico levando consigo a embalagem do produto.

Cipermetrina: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

Clorpirifós: sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (contration ou PAM).

Butóxido de piperonila: não existe antídoto específico. O tratamento deve ser sintomático.

PERÍODO DE CARÊNCIA

ATENÇÃO: OBEDECER AOS SEGUINTES PERÍODOS DE CARÊNCIA:

BOVINOS

ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 06 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE: O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO ATÉ 01 DIA APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO DESTA PRODUTO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

PRAZO DE VALIDADE

02 (dois) anos após a data de fabricação.

Após a primeira abertura do frasco utilizá-lo por no máximo 90 dias.

APRESENTAÇÕES

Frasco plástico âmbar de 20 mL e 200 mL e frasco plástico branco de 1L, todos fechados com tampa de rosca, com lacre.

Conservar as embalagens fechadas, em local seco e fresco, à temperatura ambiente (15°C a 30°C), ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Licenciado no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sob o nº 9.608 em 19/07/2011.

Resp. Técnico: Dr. Nelson Gonçalves de Oliveira CRMV-SP 9010 S

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE

Bimeda Brasil S.A.

Rod. Cônego Cyriaco S. Pires, nº 421

Monte Mor /SP – CEP 13190-000

CNPJ 00.328.741/0001-04

SAC 0800 555408

www.bimeda.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

